




MERISTEM

PLAN DE ABONADO: UVA VINIFICACIÓN



BROTACIÓN




PREFLORACIÓN



FLORACIÓN



CUAJADO



ENVERO



MADURACIÓN

Acondicionador de suelo: aporte de ácidos húmicos y fúlvicos, con aminoácidos, nitrógeno, potasio y hierro	STIMAX FLASH 2.5-5 kg/ha 4-5 aplicaciones a lo largo del ciclo	💧
Abono PK 10-6 con extracto de algas, con boro y molibdeno	STIMAX FLOWER 150-250 ml/100 L de agua · 1-2 aplicaciones a intervalos de 7-10 días	🌿
Aporte de aminoácidos de origen vegetal vía foliar	AMINOMAX N 200-300 ml/100 L de agua · Repetir según las necesidades del cultivo	🌿
Aporte de potasio	KAKUN Foliar: 200 ml/100 L · Riego: 5-10 L/ha Repetir según necesidades	🌿💧

Nota: El plan de abonado anterior es una recomendación general fruto de la experiencia y estudios realizados por Meristem que debe servir de guía, teniendo que ser adaptado en cada caso concreto en función de las condiciones locales y características del cultivo.

🌿 Aplicación foliar 💧 Aplicación radicular

PLAN DE ABONADO: UVA VINIFICACIÓN

RECOMENDACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS



STIMAX FLASH

STIMAX FLASH es un bioestimulante de fácil y rápida disolución en agua especialmente diseñado para activar los procesos metabólicos de la planta. Actúa como acondicionador del suelo, mejorando la estructura del suelo, la vida microbiana y las condiciones de salinidad en torno a las raíces.



STIMAX FLOWER

STIMAX FLOWER es una combinación de extracto de algas y nutrientes, recomendada para estimular la aparición precoz de polen, mejorar la floración y favorecer tanto el proceso de cuajado como el posterior desarrollo de los frutos.



AMINOMAX N

AMINOMAX N es un bioestimulante de fácil y rápida disolución en agua especialmente diseñado para activar los procesos metabólicos de la planta. Actúa como acondicionador del suelo, mejorando la estructura del suelo, la vida microbiana y las condiciones de salinidad en torno a las raíces.



KAKUN

KAKUN es una combinación de extracto de algas y nutrientes, recomendada para estimular la aparición precoz de polen, mejorar la floración y favorecer tanto el proceso de cuajado como el posterior desarrollo de los frutos.

